

## ПРОГРАММА «ДИАБЕТ II типа», как дополнение к существующим методам лечения

2-й тип сахарного диабета более распространен и характеризуется инсулинрезистентностью. Это означает, что инсулин вырабатывается, но в силу некоторых причин организм на него плохо реагирует. По каким причинам это происходит, мы рассмотрим ниже. Диабет 2-го типа протекает легче, чем 1-й тип, терапия его состоит в основном в коррекции питания, снижении массы тела и назначении медикаментов, регулирующих углеводный обмен.

До сегодняшнего дня считалось, что сахарный диабет нельзя излечить полностью, что лишь можно стабилизировать состояние больного и добиться таких результатов терапии, при которых человек сможет жить полноценно. Для этого пациенту было необходимо придерживаться рекомендаций врача и комплексно подходить к лечению. Как мы уже сказали, диета и медикаментозное лечение должны идти рука об руку в жизни пациентов с диагнозом диабет. Питание и применение лекарственных средств сегодня можно дополнить еще одним аспектом – поддержка и восстановление функций иммунной системы. Она дополняет и контролирует эндокринную систему, а потому от ее состояния во многом зависит возникновение и течение диабета.

Сегодня в распоряжении диабетиков, а также эндокринологов всего мира появился препарат [Трансфер фактор](#) Глюкоуч, благодаря которому многие больные диабетом начинают забывать о болезни. Этот препарат, как и все иммуномодуляторы серии, основан на информационных соединениях аминокислот, которые передают иммунную память из поколения в поколение от матери к ребенку. Трансфер фактор Глюкоуч помимо этой основы содержит также комплекс из микроэлементов и растительных экстрактов, которые помогают в утилизации глюкозы, снижают ее уровень в крови и оберегают сосуды от разрушения. Сахарный диабет, питание при котором считалось основой успешной терапии, сегодня получил новый высокоэффективный способ лечения, который воздействует по двум основным направлениям: восстановление функций иммунитета и снижение уровня сахара в крови. Опыт применения Трансфер фактора Глюкоуч, а также клинические исследования показывают, что при диабете 2-го типа практически исчезает потребность в приеме медикаментов, а при диабете 2-го типа существенно снижается потребность в глюкозе.

Если ваша цель – победить сахарный диабет, питание совместно с приемом Трансфер фактора Глюкоуч станет тем комплексом, который вернет вас к полноценной жизни.

### 1. ПРОГРАММА «ДИАБЕТ II типа», как дополнение к существующим методам лечения

№№	Продукт	Режим использования	Продолжительность
1	ТФ Классический	2 капсулы*3 раза в день	Первые 30 дней
2	ТФ Эдвенсд	1 капсула*3 раза в день	30 дней
	ТФ Глюкоуч	2 капсулы*3 раза в день	
3	ТФ Эдвенсд	1 капсула*3 раза в день	20 дней
	ТФ Кардио	2 капсулы*3 раза в день	
4	ТФ Эдвенсд	1 капсула*3 раза в день	30 дней
	ТФ Плюс	2 капсулы*3 раза в день	
2,3,4	Чередовать		

Принципы Использования Трансфер Фактора (ТФ):

1. Лечение любых заболеваний должен осуществлять дипломированный врач на основании официальных регламентирующих документов Министерства Здравоохранения и региональных органов здравоохранения и региональных органов здравоохранения.
2. ТФ совместим со всеми видами лекарственных и профилактических средств. Использование ТФ в дополнение к существующим методам лечения рекомендовано методическим письмом МЗ РФ №14/231 от 2004 г. Для широкого применения в медицинской практике в качестве средства иммунореабилитации при различных заболеваниях, позволяющего значительно увеличить частоту благоприятных исходов и довести до минимума побочные воздействия на организм.
3. ТФ является средством, восстанавливающим нормальную работу иммунной системы, а не лекарством от какого-либо конкретного заболевания. Именно иммунная система, восстанавливающая свою способность к распознаванию и уничтожению всего чужеродного, сама диагностирует пропущенные ранее заболевания и приступает к их ликвидации. Другими словами, ТФ восстанавливает способность организма к самодиагностике и самоизлечению.

#### Общие рекомендации:

1. Принимать Трансфер Фактор во время еды, запивая 0,5-1 ст.жидкости.
2. При невозможности проглатывания капсул – высыпать содержимое из капсул и использовать в виде порошка.

