

Трансфер Фактор при герпесвирусных инфекциях

Герпесвирусные инфекции являются самыми распространёнными в патологии человека. По данным ВОЗ (1995г.) на земном шаре герпесвирусами инфицированы 96% населения.

Современная классификация с учетом данных Международного комитета по таксономии вирусов (1995г.) разделяет различные виды герпесвирусов человека следующим образом:

1. Вирус простого герпеса 1-го типа – ВПГ – 1 (вирус герпеса человека 1-го типа – ВГЧ-1). Herpes simplex virus – (HSV-1)
2. Вирус простого герпеса 2-го типа – ВПГ – 2 (вирус герпеса человека 2-го типа – ВГЧ-2). Herpes simplex virus – (HSV-2)
3. Вирус ветряной оспы/опоясывающий герпес – ВВЗ (вирус герпеса человека 3-го типа – ВГЧ-3). Varicella-zoster virus (VZV)
4. Вирус Эпштейн-Бар (вирус герпеса человека 4-го типа – ВГЧ-4). Epstein-BarrVirus (EBV)
5. Цитомегаловирус - ЦМВ (вирус герпеса человека 5-го типа – ВГЧ-5). Cytomegalovirus (CMV)
6. Вирус герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6). Human herpesvirus (HHV – 6)
7. Вирус герпеса человека 7-го типа (ВГЧ-7). Human herpesvirus (HHV – 7)
8. Вирус герпеса человека 8-го типа (ВГЧ-8). Human herpesvirus (HHV – 8)

ПРОГРАММА «герпесвирусная инфекция» совместно со стандартным лечением.

№№	Продукт	Режим использования	Продолжительность
1	ТФ Классик	1 капсула*3 раза в день	30 дней
	ТФ Эдвенсд	1-2 капсула*3 раза в день	
2	ТФ Плюс	1 капсула*3 раза в день	В течении года
	ТФ Эдванс	2-3 капсула*3 раза в день	
	Далее по состоянию		

Во время обострения:

1. Трансфер Фактор Эдванс, необходимо пить каждый час, запивая 1 стаканом воды. Принимать ТФ Эдванс в таких дозировках пока герпес **2-3 дня**.
2. Так же смешивать Трансфер Фактор Эдванс с мазью ацикловир или вазелином и наносить на очаги.

Дополнительные рекомендации:

Хлорофилл и Лимфо транзит компании Эвалар. Это что бы снять воспаление в лимфоузлах.

Принципы Использования Трансфер Фактора (ТФ):

1. Лечение любых заболеваний должен осуществлять дипломированный врач на основании официальных регламентирующих документов Министерства Здравоохранения и региональных органов здравоохранения и региональных органов здравоохранения.
2. ТФ совместим со всеми видами лекарственных и профилактических средств. Использование ТФ в дополнение к существующим методам лечения рекомендовано методическим письмом МЗ РФ №14/231 от 2004 г. Для широкого применения в медицинской практике в качестве средства

- иммунореабилитации при различных заболеваниях, позволяющего значительно увеличить частоту благоприятных исходов и довести до минимума побочные воздействия на организм.
3. ТФ является средством, восстанавливающим нормальную работу иммунной системы, а не лекарством от какого-либо конкретного заболевания. Именно иммунная система, восстанавливающая свою способность к распознаванию и уничтожению всего чужеродного, сама диагностирует пропущенные ранее заболевания и приступает к их ликвидации. Другими словами, ТФ восстанавливает способность организма к самодиагностике и самоизлечению.

Общие рекомендации:

1. Применять Трансфер Фактор во время еды, запивая 0,5-1 ст. жидкости.
2. При невозможности проглатывания капсул – высыпать содержимое из капсул и использовать в виде порошка

